

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri :
Şarj numarası :

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası
13.03.2010 - 2010/136

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Polio virus type 1, Adenovirus, type 5, strain Adenovoid 75, Murine norovirus,	Ürün Tipi 2 Yer Yüze Dezenfektan	20/100 Püskürtme veya silme	
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Proteus vulgaris Bovine Enterovirüs Type	Ürün Tipi 3 Veteriner Dezenfektan	Direk uygulanır. Püskürtme veya silme	Gerçekleştirmede
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Bakteriyofaj P001, Bakteriyofaj P008.	Ürün Tipi 4 Gıda ve Yem alanı	Anti bakteriyel Antifungal 20/100 Oramında uygulanır. Püskürtme veya silme	Dezenfektan Direk uygulanır. Püskürtme veya silme

Kullanma şekli:

Yer Yüze Dezenfektan: Tüm kişisel ve umumî alanlarda okul, kreş, ev, otel, yurt, spor tesisi, kışla gibi yerlerde ve bu alanlardaki yer, duvar, eşya ekipman ve mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılır. Toplu taşıma araçları, otomobil, deniz ve hava taşıma araçlarında ve bu araçlardaki klimaların dezenfeksiyonunda. PROXILYT dezenfektan 20/100 oranında temiz suyla seyreltilerek kullanılır.

Veteriner Alanında Kullanılan Dezenfektanlar : PROXILYT Dezenfektan hayvanların yaşam alanları, taşındığı, tutulduğu yerlerde püskürtme veya silme yöntemi ile direk olarak uygulanır.

Gıda ve Yem Alanında Kullanılan Dezenfektanlar: Antibakteriyel ve Antifungal; 100 Litre Suya 20 Litre PROXILYT karıştırılarak, Antiviral etki için direk uygulanır. Gıda ekipmanları, saklama kapları, tüketim aletlerinin yüzeyleri, üretimde kullanılan boru hatları, gıda, yem ve içeceklerin taşınması, depolanması ve tüketiminde kullanılan aletlerin dezenfeksiyonunda püskürtme veya silme yöntemiyle kullanılır. Dezenfeksiyon için ürün direk uygulanır.



ÜÇE MAKİNE MEDİKAL BİLGİSAYAR
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İlkiz Sok. No:19/4 Sıhhiye - ANKARA
Tel:0312 232 14 32 / 231 99 29
Mithatpaşa Vergi Dairesi : 904 006 5049
Ticaret Sicil No: 128074

Bakır BASDAŞ
Genel Müdür
Eski Müdür

KULLANICI GRUBU
(UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA
OKUYUNUZ



PROXILYT
DEZENFEKTAN
Sıvı, Likit

Hipokloröz Asit (Aktif Klor) % 0,038
Deiyonize su % 99,962 (tamamlayan)

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GOZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HIÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli:
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun yapılmalıdır

Üretici firmasının adı ve adresi;

Doğanay Kimya San. Tic. Ltd. Şti
Deri Org San. Böl. 15. Yol VII / 2 E. parsel Tuzla / İSTANBUL
Tesislerinde fason üretilmiştir.

Ruhsat sahibinin adı ve adresi;

ÜÇE Makine Medikal Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
İlkiz Sokak No:19/4 Sıhhiye / ANKARA
Tel:0 (312) 232 14 32 Fax: 0 (312) 231 99 29

Net miktarı: 50 ml - 100 ml - 150 ml - 500 ml - 700 ml - 1 L - 5 L - 10 L - 20 L - 30 L - 50 L - 100 L

Ambalajı açılmış ürünü 2 aylık sürede kullanınız.
Ürünün oda sıcaklığında raf ömrü 5 aydır.

ÜRÜN TİPİ (2 - 3 - 4)
DEZENFEKTAN

Zehirlenme belirtileri.

Baş dönmesi, mide bulantısı, ciltte kızarıklık oluşur.

LD₅₀ (Oral , Sığan) = 8200 mg / kg

İlk Yardım ve Önlemler:

Solutma: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, steak ve hareketsiz tutulmalıdır. Solunum güçlüğü varsa oksijen verilmeli ve kısa sürede tıbbi gözetim altına alınmalıdır.

Ciltde Temas: Kiri elbiseler çıkarılmalı ve cilt akan su ile 15 Dak. yıkanmalıdır.

Göze Temas: Ürünün göz ile temasında derhal göz kapağı açık tutularak 15 Dak. Su ile yıkayın ve doktora başvurun.

Yutulursa: Kusturmayınız. Bilinç yerinde değilse ağzından bir şey vermeyiniz. Bilinç yerinde ise su içiriniz ve doktor çağırınız.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Belirli bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR
DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU
TELEFONUNU ARAYINIZ.**

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünü orijinal ambalajında ve kapalı olarak muhafaza ediniz.
Güneş almayan serin yerlerde muhafaza ediniz,

Anılar için zehirlidir.

Balklar ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI
Sınıflandırılmamıştır.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

Sınıflandırılmamıştır.



BAKANLIK ONAYI

17 Mart 2017