

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

| Zararlı Türü-Yaşam evresi | Uygulama alanı ve şekli | Uygulama dozu | Uygulama aralığı |
|---|---|---|------------------|
| S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli, Calibicans, A. brasiliensis, Polio virus type 1, Adenovirus, type 5, Murine norovirus, | El ve cilt için antiseptik solüsyon - Ovalama Yara çevresi temizliği Antiseptik Çözelti - Silme, Ovalama Gargara - Antiseptik Çözelti - Çalkalama El ve cilt için antiseptik solüsyon Yara çevresi temizliği Silme, ovalama | Direkt Uygulama: 1 dakika Direkt Uygulama: 1 dakika Direkt Uygulama: 1 dakika Direk uygulamır 60 dk. | Gerektiğinde |
| S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli, Calibicans, A. brasiliensis, Polio virus type 1, Adenovirus, type 5, Murine norovirus, strain, | Yer ve Yüze Dezenfektan - silme, paspaslama, | 1/1 - 1/10 - 1/20 oranında sulandırılarak uygulanır. | Gerektiğinde |
| S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli, Calibicans, A. brasiliensis, M. Avium, Bovine Enterovirus Type1 | Kapalı Oraman dezenfektan - silme, clean room, fiskeleme, | 1 ton suya 1/20 oranında ürün katılır. | Gerektiğinde |
| S. aureus, P. aeruginosa, E. Hirae, P. Vulgaris, Calibicans, A. Brasiliensis, M. Avium, Bovine Enterovirus Type1 | Veteriner Alanında, Hayvan Barınaklarında, ahır, ağı, kümes vs. gibi yerlerde - Dozajlama, silme, paspaslama, silme, paspaslama, silme, paspaslama, silme, paspaslama, silme, paspaslama, silme vs. | Ürün direkt uygulanır. | Gerektiğinde |
| S. aureus, P. Aeruginosa, E. Coli, E. Hirae, C. Albicans, A. brasiliensis | Kirillik Düzeyine göre; Müfak yer - yüzeyleri, müfak ekipmanları vs. - yıkama, silme, paspaslama, paskürme, silme vs. | 1/1 - 1/10 - 1/20 oranında uygulanır | Gerektiğinde |

El ve Cilt Antiseptiği: Genel Haikın kullanımına uygundur. Ovalama yapılır. Durulama gerektirmez.

Yara Çevresi Bakım Antiseptik Çözelti: Silme

Gargara: Çalkalama, yıkama.

Yer ve Yüze Dezenfektanı: Tüm yer ve yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılır. Silme, paspaslama, daldırma yöntemlerinden uygun olan tercih edilir.

Veteriner Alanında Kullanımı: Yara çevresinin bakımında, yer ve yüzey dezenfeksiyonunda kullanılır. Silme, paspaslama, yıkama, daldırma vs. gibi yöntemlerden uygun olan tercih edilir.

Gıda Alanlarının Temizliğinde Kullanımı: yer - yüzey, alet ve ekipman temizliğinde kullanılır. Ürünümüz Gıda alanlarında dezenfeksiyon etkisi yoktur.

Üretici firmanın adı ve adresi:

BİOTEM OKSİLİTE MED. TİC. SAN. LTD. ŞTİ
Bahçe Mh. Deniz Bayrak Caddesi Dış Kapı No:2/C İç Kapı No:13 Anamur - MERSİN

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

BİOTEM OKSİLİTE MED. TİC. SAN. LTD. ŞTİ
Sağlık Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:88
Anamur-Mersin

Tel: 0324 816 73 07 Fax: 0324 816 74 07

www.bioxi.com.tr info@bioxi.com.tr

Net miktarı: 200 ml - 250 ml - 500 ml - 750 ml - 1 L - 5 L - (Genel Halk)

10 L - 20 L - 30 L - 1000 litre (İbce tank) (Uzman Personel)

Ambalajı açılmış ürünü 1 hafta içinde kullanınız.

Ürünün oda koşullarında raf ömrü 2(iki) aydır.

KULLANICI GRUBU

Tip 1-2-3-4: GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

BİOTEM OKSİLİTE MED. TİC. SAN. LTD. ŞTİ



Bioxi

Formülasyon şekli: Sıvı

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

Sodyum Hipoklorit Cas No: 7681-52-9 %0,024

Aktif Klor %0,0229

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Çözütü % 99,976

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HIÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM EK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun imha ediniz.

ÜRÜN TİPİ (1-2-3-4)

Tip 1: İnsan Hijyeni İle İlgili Biyosidal Ürünler

Tip 2: Yer ve Yüze Dezenfektanı

Tip 3: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler

Tip 4: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar

Zehirlenme belirtileri:

Üst solunum yolları tahrişi, bulantı, kusma, cilt tahrişi

LD₅₀ değerleri

Sodyum Hipoklorit LD₅₀ 5000 mg/kg

İlk yardım önlemleri

Solunma: Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Solunum durmuşsa, suni solunuma tabik edin. Kazazedeyi sıcak tutun ve dinlendirin. Hemen sağlık görevlisini çağırın.

Yutma: ŞUURU YERİNDE OLMAYAN BİR KİMSEYİ KEŞİNLİKLE KUSTURMAYIN VE BİR SIVI İÇİRMİYİN! Ağız iyice çalkalayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Ciltle Temas: Kazazedeyi kirlenme yerinden uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi hemen bol suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

Gözlerle Temas: Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayınız.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde depolayın. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Doğrudan güneş ışığından koruyun. Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir. ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

Sınıflandırılmamıştır

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

Sınıflandırılmamıştır

Sınıflandırılmamıştır



BİOTEM OKSİLİTE MEDİKAL TAAR İPŞ. PLASTİK TEKSTİL İPŞ. MEE DAY TAAR İMAL. TAR. İTH. İHR. T.C. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Anamur Y.D. 17.6.07 5634
Sağlık Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:88 ANAMUR/MERSİN
TEL: 0324 816 7207

Ebru ÜSAL
M. M. H. Ü.
S. Ü.